

 Gelacne<sup>®</sup>

Adapaleno / Peróxido de Benzoilo  
Actuando en los pilares del acné



# Gelacné®

## ADAPALENO / PERÓXIDO DE BENZOÍLO

5 gr

Ungüento  
Uso externo



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

### FÓRMULA:

Cada 100 g de gel tópico contiene:

Adapaleno	0,10 g
Peróxido de Benzoilo	2,50 g
Excipientes c.s.: Propilenglicol, Glicerol, Dioctilsulfosuccinato de sodio, Poloxamero 188, Edetato disódico, Metilparabeno, Poliacrilato 13/Poliisobutano/Polisorbato 20, Macrogol 400, Agua purificada.	

### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antiacnéico de uso tópico.

### ATC:

D10AD53

### GRUPO TERAPÉUTICO:

Retinoides de uso tópico en acné.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

### ¿PARA QUÉ SE UTILIZA ESTE MEDICAMENTO?

Tratamiento tópico del acné vulgaris, en presencia de comedones, pápulas y pústulas.

### ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO:

Antes de usar este medicamento debe sopesarse los riesgos y beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre usted y su médico.

Principalmente debe considerar los aspectos siguientes:

- Alergias: Usted debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos.
- No debe aplicarse GELACNÉ® sobre la piel dañada, ya sea piel lastimada (cortes o abrasiones) o eccematosa, o quemada por el sol.
- Embarazo: No es recomendable el uso de este producto durante el embarazo.
- Lactancia: El uso de este medicamento durante el período de lactancia debe evitarse; si es que se utiliza, para evitar el contacto con el recién nacido, no se debe aplicar el producto en el pecho de la mujer.
- GELACNÉ® no es fototóxico ni provoca fotosensibilización; no obstante, se debe evitar la exposición excesiva a la luz solar o a la radiación UV. GELACNÉ® no debe estar en contacto con material coloreado, incluyendo el cabello y géneros teñidos, ya que puede producirse blanqueamiento y decoloración.
- Es importante que no utilice más cantidad de producto que la prescrita pues se puede causar más irritación sin mejorar los resultados finales
- Este producto no debe entrar en contacto con los ojos, boca, fosas nasales o membranas mucosas. De ocurrir lavar inmediatamente la zona con agua tibia.
- Este producto contiene propilenglicol, que puede causar irritación cutánea.

### CONTRAINDICACIONES:

Este medicamento no debe ser usado en pacientes que presenten algunas de las siguientes afecciones, excepto si su médico lo indica:

- Hipersensibilidad conocida a las sustancias activas o a cualquier componente de la formulación.

### USO CON OTROS MEDICAMENTOS (INTERACCIONES):

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Usted debe comunicar a su médico de todos los medicamentos que está tomando ya sea con o sin receta médica antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:

- Este producto no debe entrar en contacto con los ojos, boca, fosas nasales o membranas mucosas. De ocurrir lavar inmediatamente la zona con agua tibia.
- Este producto contiene propilenglicol, que puede causar irritación cutánea.

### POSIBLES REACCIONES ADVERSAS (efectos no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Algunos de estos efectos requieren atención médica. Los efectos adversos más comunes pueden aparecer durante las dos a cuatro primeras semanas de tratamiento y usualmente disminuyen con el tratamiento continuo. Los efectos colaterales más frecuentes son: piel seca, dermatitis de contacto irritativa, formación de escamas, eritema y ardor. Poco frecuentes: irritación y quemadura por exposición solar.

Efectos adversos con frecuencia no conocida que se han descrito para este medicamento incluyen: Edema palpebral, sensación de opresión en la garganta, disnea, dermatitis alérgica de contacto, hinchazón de la cara, dolor en la piel (picaazón cutánea), ampollas (vesículas), decoloración de la piel, urticaria, reacción anafiláctica.

De ocurrir irritación cutánea tras la aplicación de GELACNÉ® gel, la intensidad es generalmente leve a moderada, con síntomas que llegan a un pico durante las primeras dos semanas y luego disminuyen

Si sospecha que sufre algún efecto adverso que es grave, o si Usted nota cualquier otro efecto molesto no mencionado consulte con el médico.

### SOBREDOSIFICACIÓN GELACNÉ®:

Gel está indicado para ser utilizado por vía externa.

En caso de ingestión accidental y ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Centro Asistencial más cercano llevando el producto o comunicarse con los Centros de Toxicología.

### CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

Use este medicamento siguiendo las instrucciones de uso, no use más ni con mayor frecuencia que la indicada. Este medicamento debe aplicarse sobre la piel afectada. No ingerir. La aplicación de este medicamento debe realizarse con las manos lavadas y la zona afectada limpia y seca. Debe aplicarse una delgada capa del producto en las áreas afectadas de la piel de tal forma de cubrir toda la zona con lesiones y evitando aplicar el producto en ojos, fosas nasales y labios.

El médico debe indicar el tiempo de tratamiento apropiado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: una vez al día, antes de acostarse.

Si olvida aplicarse una dosis, debe continuar con el horario y dosificación indicada, no debe aplicársela más tarde ni mucho menos aplicar el doble de la dosis indicada.

En caso de irritación, dependiendo de la severidad, aplicar humectantes no comedogénicos, reducir la frecuencia de las aplicaciones (ej.: día por medio), suspender su uso en forma temporaria, o discontinuar su uso por completo.

**Uso en niños:**

No se ha estudiado la seguridad y eficacia de este medicamento en niños menores a los 9 años de edad.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

**PRESENTACIÓN:**

GELACNE® gel tópico:  
Envase conteniendo 30 g de gel.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30 °C.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO.  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.**

**DEUTSCHE**<sup>®</sup>  
P H A R M A ● ● ●